

| レジメン名 | 商品名 | 一般名 | 投与量 | 投与時間 | 投与日 | 1クール | 催吐性リスク |
|---------------|----------|------------------------|-------------------------|------|---------|------|--------|
| キイトルーダ療法 | キイトルーダ | ペムブロリズマブ | 200mg | 30分 | day1 | 21日 | 最小 |
| FOLFILI±BEV | ベバシズマブ | ベバシズマブ | 5mg/kg | 1時間半 | day1 | 14日 | 中等度 |
| | イリノテカン | イリノテカン | 180mg/m ² | 1時間 | | | |
| | レボホリナート | レボホリナート | 200mg/m ² | 2時間 | | | |
| | 5-FU | フルオロウラシル | 400mg/m ² | 全開 | | | |
| mFOLFOX6±BEV | ベバシズマブ | ベバシズマブ | 5mg/kg | 1時間半 | day1 | 14日 | 中等度 |
| | オキサリプラチン | オキサリプラチン | 85mg/m ² | 2時間 | | | |
| | レボホリナート | レボホリナート | 200mg/m ² | 2時間 | | | |
| | 5-FU | フルオロウラシル | 400mg/m ² | 全開 | | | |
| SOX±BEV | ベバシズマブ | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 1時間半 | day1 | 21日 | 中等度 |
| | オキサリプラチン | オキサリプラチン | 130mg/m ² | 2時間 | day1-14 | | |
| CapOX±BEV | ベバシズマブ | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 1時間半 | day1 | 21日 | 中等度 |
| | オキサリプラチン | オキサリプラチン | 130mg/m ² | 2時間 | day1-14 | | |
| FOLFILI±PANI | ゼローダ | カペシタピン | 000mg/m ² /分 | 内服 | day1-14 | 14日 | 中等度 |
| | バクティビックス | パニツムマブ | 6mg/kg | 1時間 | | | |
| mFOLFOX6±PANI | イリノテカン | イリノテカン | 180mg/m ² | 1時間半 | day1 | 14日 | 中等度 |
| | レボホリナート | レボホリナート | 200mg/m ² | 2時間 | | | |
| | 5-FU | フルオロウラシル | 400mg/m ² | 全開 | | | |
| | | | 2400mg/m ² | 46時間 | | | |
| FOLFOXIRI±BEV | ベバシズマブ | ベバシズマブ | 5mg/kg | 1時間半 | day1 | 14日 | 高度 |
| | イリノテカン | イリノテカン | 165mg/m ² | 1時間半 | | | |
| | オキサリプラチン | オキサリプラチン | 85mg/m ² | 2時間 | | | |
| | レボホリナート | レボホリナート | 200mg/m ² | 2時間 | | | |
| IRIS±BEV | 5-FU | フルオロウラシル | 3200mg/m ² | 全開 | | 28日 | 中等度 |
| | ベバシズマブ | ベバシズマブ | 5mg/kg | 1時間半 | day1,15 | | |
| FOLFILI+RAM | イリノテカン | イリノテカン | 125mg/m ² | 1時間半 | day1,15 | 14日 | 中等度 |
| | TS-1 | テガフル オテラシル ギメラシル | 80mg/m ² | 内服 | day1-14 | | |
| FOLFILI+AFL | サイラムザ | ラムシルマブ | 8mg/kg | 1時間 | day1 | 14日 | 中等度 |
| | イリノテカン | イリノテカン | 180mg/m ² | 1時間 | | | |
| | レボホリナート | レボホリナート | 200mg/m ² | 2時間 | | | |
| | 5-FU | フルオロウラシル | 400mg/m ² | 全開 | | | |
| mXELIRI±BEV | ザルトラップ | アフリベルセプト | 4mg/kg | 1時間 | day1 | 21日 | 中等度 |
| | イリノテカン | イリノテカン | 180mg/m ² | 1時間 | | | |
| | レボホリナート | レボホリナート | 200mg/m ² | 2時間 | | | |
| | 5-FU | フルオロウラシル | 400mg/m ² | 全開 | | | |
| IRI+PANI | | | 2400mg/m ² | 46時間 | | 14日 | 中等度 |
| | ベバシズマブ | ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 1時間半 | day1 | | |
| Cap+BEV | イリノテカン | イリノテカン | 200mg/m ² | 1時間半 | day1 | 21日 | 最小 |
| | ゼローダ | カペシタピン | 600mg/m ² /分 | 内服 | day1-14 | | |
| S-1+BEV | イリノテカン | イリノテカン | 150mg/m ² | 1時間半 | day1 | 21日 | 最小 |
| | バクティビックス | パニツムマブ | 6mg/kg | 1時間 | day1 | | |