

【膵癌】 2026.3 更新

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐性リスク
ゲムシタピン	ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分	day1.8.15	28日	軽度
ゲムシタピン+アブラキサン	ゲムシタピン アブラキサン	ゲムシタピン パクリタキセル	1000mg/m ² 125mg/m ²	30分	day1.8.15	28日	軽度
FOLFIRINOX療法	オキサリプラチン	オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	day1	14日	高度
	レボホリナート	レボホリナート	200mg/m ²	2時間			
	イリノテカン	イリノテカン	180mg/m ²	1時間半			
	5-FU	フルオロウラシル	400mg/m ²	全開			
			2400mg/m ²	46時間			
mFOLFIRINOX療法	オキサリプラチン	オキサリプラチン	85mg/m ²	2時間	day1	14日	高度
	レボホリナート	レボホリナート	200mg/m ²	2時間			
	イリノテカン	イリノテカン	150mg/m ²	1時間半			
	5-FU	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間			
オニバイド+5-FU/LV療法	オニバイド レボホリナート 5-FU	イリノテカン(リポソーム製剤) レボホリナート フルオロウラシル	70mg/m ² 200mg/m ² 2400mg/m ²	1時間半 2時間 46時間	day1	14日	中等度

※投与時間は、初回投与を記載しています(2回目以降短縮される薬剤もあり)。支持療法の時間は含まれておりません。