

## 【胆道癌】

2026.3 更新

レジメン名	商品名	一般名	投与量	投与時間	投与日	1クール	催吐性リスク
ゲムシタピン療法	ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8.15	28日	軽度
GC療法	シスプラチン	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1.8	21日	中等度
	ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8	21日	
GS療法	TS-1	ゲムシタピン	100mg/body	内服	day1-14	21日	軽度
		テガフル オテラシル ギメラシル					
GCF療法	ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1	14日	中等度
	シスプラチン	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1		
	TS-1	ゲムシタピン	80mg/body	内服	day1-7		
		テガフル オテラシル ギメラシル					
デュルバルマブ+GC療法	イミフィンジ	デュルバルマブ	1500mg	1時間	day1	21日	中等度
	シスプラチン	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1.8		
	ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8		
パムプロリスマブ+GC療法	キイトルーダ	パムプロリスマブ	200mg	30分	day1	21日	中等度
	シスプラチン	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	1時間	day1.8		
	ゲムシタピン	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	30分	day1.8		

※投与時間は、初回投与を記載しています(2回目以降短縮される薬剤もあり)。支持療法の時間は含まれておりません。